

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|---|--|---|--|---|
| <p>An Händen und Unterarmen dürfen während der Arbeit weder Schmuckstücke, Uhren noch Ringe getragen werden. Fingernägel müssen kurz und sauber sein. Nagellack und künstliche Fingernägel sind nicht gestattet.</p> | | | | |
|  Hygienische Händedesinfektion | C 20 Hände + Haut Desinfektion 100 %, 30 Sek. Noro-Viren: 100 %, 30 Sek. | -2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben. -Gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen, einschl. Handgelenke verreiben. -Während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten. | -Vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. Nahrungsaufnahme -Vor der Zubereitung von Essen -Vor der Essensausgabe -Nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei -Vor Dienstbeginn, nach Pausen, Toilettenbesuch bzw. Dienstende -Vor dem Anziehen/nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen -Nach Kontakt mit infektiösen/m Personen/Material -Nach Niesen/Husten/Naseputzen -Nach Beendigung von Reinigungs- oder Schmutzarbeiten | -Alle Mitarbeiter |
| Händereinigung | C 45 Waschlotion 100 % | -1 Hub aus Spender (2 ml) Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen. Gründlich mit kaltem Wasser abspülen. -Mit Einmalhandtuch sorgfältig trocknen. | -Bei Bedarf -Bei Arbeitsbeginn und -ende | -Alle Mitarbeiter |
| Händepflege | C 50 Pflegelotion 100 % | -Pflegelotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -Nach dem Waschen und Trocknen -Bei individuellem Bedürfnis -Nach Arbeitsende | -Alle Mitarbeiter |
| Hautschutz | C 60 Hautschutzschaum 100 % | -Hautschutzschaum in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -Vor Arbeitsbeginn -Vor Feuchtarbeiten -Vor dem Tragen von Handschuhen | -Alle Mitarbeiter |
| <p>Auf spannungslosen Zustand der Geräte achten!</p> | | | | |
|  Arbeitsflächen, Theken, Transportwagen | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeignetem Tuch feucht wischen. | -1 x täglich | -Pflegeteam -Hauswirtschaftspersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 5 Min. (IHO-LMH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln (Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei) | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. 20° C: 0,5 %, 5 Min. (IHO-LMH) | -Wie oben. -Lebensmittelberührende Flächen nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen. | -Wie oben | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. 5 Min. (IHO-LMH) | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Kühlschrank | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 5 Min. (IHO-LMH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -1 x wöchentlich -Nach dem Abtauen | -Pflegeteam -Hauswirtschaftspersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. 20° C: 0,5 %, 5 Min. (IHO-LMH) | -Wie oben. -Gründlich mit Trinkwasser nachwischen. | -Wie oben | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. 5 Min. (IHO-LMH) | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Mikrowelle | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 5 Min. (IHO-LMH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -1 x wöchentlich | -Pflegeteam -Hauswirtschaftspersonal |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan | für die Wohnbereichsküche | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 20.12.17 | Datum | Datum | Datum |

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|---|--|--|--|---|
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. 5 Min. (IHO-LMH) | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben -Gründlich mit Trinkwasser nachwischen. | -Wie oben | -Wie oben |
| Schränke, Schubladen, Griffe | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeignetem Tuch feucht wischen. | -1 x wöchentlich -Griffe: 1 x täglich | -Pflegepersonal -Hauswirtschaftspersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 5 Min. (IHO-LMH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. 20° C: 0,5 %, 5 Min. (IHO-LMH) | -Wie oben. -Lebensmittelberührende Flächen nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen. | -Wie oben | -Wie oben |
| Waschbecken, Ausgüsse | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. 20° C: 0,5 %, 5 Min. (IHO-LMH) | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x täglich | -Pflegepersonal -Hauswirtschaftspersonal |
| Abfallbehälter | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. 20° C: 0,5 %, 5 Min. (IHO-LMH) | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach jeder Entleerung -1 x täglich | -Pflegepersonal -Hauswirtschaftspersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. 5 Min. (IHO-LMH) | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
|  Fußböden | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode reinigen. -Anwendung mittels Scheuersaugmaschine. | -1 x täglich | -Küchenpersonal -Reinigungspersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. 20° C: 0,5 %, 5 Min. (IHO-LMH) | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. 5 Min. (IHO-LMH) | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |

Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen.

Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln dürfen keine offenen Lebensmittel in der Nähe sein.

Bei der Anwendung von Reinigern mit anionischen Tensiden und Desinfektionsmitteln im Wechsel kann es zu Verminderung der Reinigungs- bzw. Desinfektionswirkung kommen. Daher ist im Zweifelsfall zwischen beiden Schritten zu wässern.

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Desinfektion und Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und internen Veränderungen anzupassen.

Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle testen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

C 20 - 2-Propanol 70 % (V/V) - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Köhlumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan | für die Wohnbereichsküche | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 20.12.17 | Datum | Datum | Datum |