




Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|---|--|---|--|-------------------------------|
|  Hygienische Händedesinfektion | C 20 Hände + Haut Desinfektion 100 %, 30 Sek. Noro-Viren: 100 %, 30 Sek. | -2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben. -Gründlich auf allen Hand- und Fingerflächen, einschl. Handgelenke verreiben. -Während der gesamten Einwirkzeit feuchthalten. -Bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen. | -Vor dem Anziehen/nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen -Vor/nach pflegerischen Tätigkeiten -Vor jeder Shuntpunktion -Vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. Nahrungsaufnahme -Vor Dienstbeginn, nach Pausen, Toilettenbesuch bzw. Dienstende -Nach Kontakt mit infektiösen/m Personen/Material | -Alle Mitarbeiter |
| Händereinigung | C 45 Waschlotion 100 % | -1 Hub aus Spender (2 ml) Waschlotion auf die angefeuchteten Hände geben, aufschäumen. Gründlich mit kaltem Wasser abspülen. -Mit Einmalhandtuch sorgfältig trocknen. | -Bei Bedarf -Nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung | -Alle Mitarbeiter |
| Händewaschung | C 45 Waschlotion 100 % | -Hände und Unterarme mit kaltem Wasser anfeuchten, mit 1 Hub Waschlotion aus Spender einreiben, aufschäumen und gemäß Standard-Waschverfahren 1 Min. gründlich waschen. Danach mit kaltem Wasser abspülen und mit keimarmem Einmalhandtuch trocknen. | -Vor der chirurgischen Händedesinfektion | -Arzt -Fachpersonal |
| Chirurgische Händedesinfektion | C 20 Hände + Haut Desinfektion Chirurgische Händedesinfektion: 100 %, 5 Min. | -Chirurgische Händedesinfektion: Trockene Hände und Unterarme vollständig mit Händedesinfektionsmittel benetzen und gemäß Standard-Einreibeverfahren kräftig verreiben. Während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. | -Invasive Eingriffe, wie z. B. Stuntanlage, Anlage eines Peritonealkatheters | -Arzt -Fachpersonal |
| Händepflege | C 50 Pflegelotion 100 % | -Pflegelotion in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -Bei Bedarf -Nach dem Waschen und Trocknen | -Alle Mitarbeiter |
| Hautschutz | C 60 Hautschutzschaum 100 % | -Hautschutzschaum in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten. | -Bei Bedarf -2 - 3 x täglich -Vor dem Tragen von Handschuhen | -Alle Mitarbeiter |
| Hautdesinfektion | C 20 Hände + Haut Desinfektion (für die Haut) 100 %, 30 Sek. Noro-Viren: 100 %, 30 Sek. | -Aufsprühen und trocknen lassen oder auf einen Tupfer geben und die Haut benetzen, nicht trocken reiben, 30 Sek. einwirken lassen. | -Vor (Shunt-)Punktionen und -Injektionen | -Arzt -Fachpersonal |
|  Dialysegerät Gehäuse | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach jeder Benutzung -Nach einer Standzeit von mehr als 2 Tagen -Nach Reparatur vor Wiederinbetriebnahme -bei Nachweis erhöhter Keimzahl in der Dialysierflüssigkeit | -Medizinische Fachangestellte |
| Siehe Bereich darüber | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
|  Oberflächen medizinischer Geräte, patientennahe Flächen im Behandlungsbereich und Eingriffsraum | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach jeder Benutzung -Nach Kontamination sofort | -Medizinische Fachangestellte |
| Siehe Bereich darüber | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |



| | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen | | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 20.12.17 | Datum: | Datum: | Datum: |

Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Arbeitsflächen von Laboren und Laborarbeitsplätzen, Arbeitsflächen in reinen Arbeitsräumen (Dienstzimmer etc.) | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Mind. 1 x täglich -Bei sichtbarer Kontamination | -Medizinische Fachangestellte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Wasser und dialyseführende Teile | Nach Herstellerangaben | -Nach Herstellerangaben | -Nach jeder Benutzung | -Medizinische Fachangestellte |
| Medikamentenkühlschrank | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Ggf. Kontamination mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch entfernen. -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach Kontamination sofort -1 x wöchentlich | -Medizinische Fachangestellte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Matratzenüberzüge, Nacken-/Knie rollen (flüssigkeitsdicht) | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Kontamination sofort | -Medizinische Fachangestellte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Patientenferne Flächen (Schubladen, Schränke, etc.) | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeignetem Tuch feucht wischen. | -1 x wöchentlich | -Reinigungspersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Kontamination sofort | -Medizinische Fachangestellte |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Blutdruckmanschetten, Stethoskope, etc. | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -Nach Kontamination sofort | -Medizinisches Fachpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Desinfektionstuch aus Flowpack entnehmen. -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
| Fieberthermometer, Blutzuckermessgeräte, Stauschläuche | B 33 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) 100 %, 30 Sek. (Noro-Viren) | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -Nach jeder Benutzung | -Medizinisches Fachpersonal |
| Siehe Bereich darüber | B 15 Desinfektionstücher 2 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 5 Min. | -Wie oben | -Wie oben | -Wie oben |
|  Fußböden im Behandlungs- und Eingriffsraum | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen. | -Bei Bedarf -1 x täglich -Nach Kontamination sofort | -Reinigungspersonal |
| Fußböden in Sanitärbereichen, Schmutzarbeitsräumen, etc. | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen. | -1 x täglich -Nach Verunreinigungen mit Körperflüssigkeiten bzw. Ausscheidungen | -Wie oben |
| Alle weiteren Fußböden | orochemie® Schonreiniger 25-50 ml/10 l Wasser Bei hartnäckiger Verschmutzung höhere Dosierung | -Mit geeigneter Nass-Wisch-Methode reinigen. | -1 x täglich | -Wie oben |
|  Toiletten und sanitäre Einrichtungen (Patienten und Personal) Türen und Türklinken | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen. | -1 x täglich -Nach Kontamination sofort | -Reinigungspersonal |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen | | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 20.12.17 | Datum: | Datum: | Datum: |

Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen

| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|--|--|---|--|-----------------------------|
| Siehe Bereich darüber | B 40 Schnelldesinfektion 100 %, 1 Min. (VAH) Noro-Viren: 100 %, 1 Min. | -Wie oben. | -Wie oben | -Wie oben |
| Steckbecken, Urinflaschen, Eimer von Toilettenstühlen etc. | B 15 Wischdesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) Volle Viruzidie: 2 %, 5 Min. | -In Desinfektionslösung einlegen, vollständig benetzen, einwirken lassen. | -Direkt nach Benutzung | -Pflegepersonal |
|  Allgemeine, chirurgische Instrumente | A 20 Instrumentendesinfektion 2 %, 5 Min. (VAH) 2 %, 30 Min. (Noro-Viren) | -Manuelle Instrumentenaufbereitung: Zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen und auf vollständige Benetzung achten -Einwirken lassen, ggf. nachreinigen und erneut einlegen -Gründlich mit Wasser abspülen, trocknen lassen -Ggf. Sterilisation zuführen | -Direkt nach Gebrauch | -Medizinisches Fachpersonal |
|  Absauggeräte-desinfektion | D 10 Absauggeräte-desinfektion 2 %, 1 Stunde | -Vor Gebrauch 10 - 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen. -Gerät äußerlich wischdesinfizieren, einwirken lassen. -Nach jeder Anwendung D 10-Gebrauchslösung durch Schlauch saugen. -1 x tägl. kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche, etc.) in D 10-Gebrauchslösung einlegen, einwirken lassen. -Nach Einwirkzeit mit Trinkwasser spülen. -Übungsmasken in Desinfektionslösung einlegen, nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser und Einmaltuch oder Schwamm nachwischen, trocknen, in geschlossenen Boxen lagern. | -Vor Gebrauch -Direkt nach Gebrauch -1 x täglich | -Medizinisches Fachpersonal |
| Medikamentenbecher, Trinkbecher und -gläser, Geschirr und Besteck | Geschirrspülmaschine | -Nach Programm | -In verschlossenen Behältern direkt zur Spülmaschine bringen. -Nach Programm bei mind. 60°C spülen. | -Medizinisches Fachpersonal |

Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen.
 Bei der Anwendung von Reinigern mit anionischen Tensiden und Desinfektionsmitteln im Wechsel kann es zu Verminderung der Reinigungs- bzw. Desinfektionswirkung kommen. Daher ist im Zweifelsfall zwischen beiden Schritten zu wässern.
 Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und internen Veränderungen anzupassen.
 Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 C 20 - 2-Propanol 70 % (V/V) - Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser.
 Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge. Gegenanzeigen: C 20 ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf C 20 nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Einreibungen der Haut mit C 20 können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Hinweise: Dicht verschlossen lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

| Ausbruchmanagement | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------|
| Bereich | Produkt | Vorgehensweise | Häufigkeit | Verantwortlich |
|  Hygienische Händedesinfektion | Chirosyn Händedesinfektion 100 %, 30 Sek. (VAH) Alle Viren: 100 %, 1,5 Min. (RKI A+B) | -Händedesinfektion wie im Plan oben beschrieben. | -Wie im Plan oben beschrieben | -Alle Mitarbeiter |
|  Flächen, Oberflächen, Gegenstände etc. (die im Regelfall desinfiziert werden) | B 5 Wischdesinfektion Sporen: 2 %, 30 Min. Wirkungsbereich A (Bakterien und Pilze): 7 %, 4 Std. (RKI) Wirkungsbereich B (Viren): 2 %, 4 Std. (RKI) | -Flächendesinfektion wie im Plan oben beschrieben. | -Wie im Plan oben beschrieben | -Alle Mitarbeiter |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|
| Einrichtung: | Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen | | |
| Ersteller: | Prüfung: | Freigabe: | Evaluation am: |
| Datum: 20.12.17 | Datum: | Datum: | Datum: |

Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen

Beim Auftreten meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten oder bei begründetem Verdacht sind spezielle Maßnahmen erforderlich, die vom Gesundheitsamt veranlasst oder mit diesem abgestimmt werden.
 Personal zahlenmäßig begrenzen und schulen.
 ChiroSyn Händedesinfektion - Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoffe 56,7 g Ethanol 96% (v/v) und 10 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglykol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Parfum fresh. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: ChiroSyn Händedesinfektion darf nicht auf den Schleimhäuten und offenen Wunden angewendet werden. Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf ChiroSyn Händedesinfektion nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Insbesondere bei mehrfacher Anwendung kann es zu Irritationserscheinungen der Haut (z. B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) und bei hochfrequenter Anwendung auch zu weiter gehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Das Ausmaß und der Schweregrad dieser Erscheinungen hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Irritationserscheinungen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Hinweise: Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

| | | | |
|------------------------|---|------------------|-----------------------|
| <i>Einrichtung:</i> | <i>Muster-Desinfektionsplan und Reinigungsplan für Dialyseeinrichtungen</i> | | |
| <i>Ersteller:</i> | <i>Prüfung:</i> | <i>Freigabe:</i> | <i>Evaluation am:</i> |
| <i>Datum: 20.12.17</i> | <i>Datum:</i> | <i>Datum:</i> | <i>Datum:</i> |